

Beurré d'Amanlis

Description générale

Essence Poirier

Variété Beurré d'Amanlis

Synonymes

Type de variété Ancienne

Origine Découvert près de Rennes en 1858



Utilisations

Table (bon à croquer) Cuisine (bon à cuire) Jus Séchage Conserve

Aucune indication

Données agronomiques

Type de variété : Fruit précoce

Récolte Mi-sept

Maturité Mi-sept. à début oct.

Grosueur Moyenne à grosse

Chair Demi-fondante, juteuse, aromatisée

Maladies Sensible à la tavelure

Remarques

Arbre robuste et fertile

Références


Arbre connu dans le Parc : chez M. Roger Mottier à l'Etambeau sur la commune de Château-d'Oex ; n°59 ; alt. 950 m

Baltet C., 1994 : Les bonnes poires

Beurré Hardy

Description générale

Essence	Poirier
Variété	Beurré Hardy
Synonymes	Poire Hardy Gellert's Butterbirne Hardy's Butterbirne
Type de variété	Classique
Origine	Semis de hasard à Boulogne-sur-Mer En 1830. Diffusé à partir de 1830 par Jean-Laurent Jamin



Utilisations

- Table (bon à croquer)
 Cuisine (bon à cuire)
 Jus
 Séchage
 Conserve
- Aucune indication

Données agronomiques

Type de variété : Fruit précoce

Récolte Mi-sept. à fin sept. **Maturité** De suite – jusqu'à fin sept.

Grosueur Moyenne à grosse

Chair Blanc jaunâtre, parfois verdâtre, fondante, juteuse, sucrée, finement acidulée, arôme particulier

Maladies Sensible à la tavelure
Sensible au chancre
Peu sensible au gel sur bois

Remarques

Prospère aussi en altitude. Variété vigoureuse ; convient à toutes les formes.

Références

Arbre connu dans le Parc : en espalier, au Chamaveau sur la commune de Château-d'Oex ; n°373 ; alt. 880 m

Leroy, A., 1873 : Dictionnaire de Pomologie
Aeppli A. et al., 1983 : 100 variétés de fruits

Clapps Favorite

Description générale

Essence	Poirier
Variété	Clapps Favorite
Synonymes	Clapps Liebling
Type de variété	Classique
Origine	Probablement d'un semis de fondante des bois effectué en 1860 par Th. Clapp à Dorchester, USA



Utilisations (non documenté)

- Table (bon à croquer) Cuisine (bon à cuire) Jus Séchage Conserve
- Aucune indication

Données agronomiques

Type de variété	Fruit précoce		
Récolte	Début août à mi-août	Maturité	De suite
Grosueur	gros fruits		
Chair	jaunâtre, fondante, juteuse, sucrée, arôme prononcé agréable		
Maladies	modérément sensible à la tavelure		

Remarques

Bonne résistance au froid d'hiver

Références

Arbre connu dans le Parc : chez M. Daniel Schori au vallon de Villard sur la commune de Montreux ; n°353 ; alt. 1000 m

Aeppli A., et al., 1983 : 100 variétés de fruits
Kessler H., 1948 : Birnensorten der Schweiz

Curé

Description générale

Essence	Poirier
Variété	Curé
Synonymes	
Type de variété	Classique
Origine	Connu en 1760 ; poirier sauvage dont le fruit parut assez remarquable au curé d'une paroisse du département d'Indre (centre de la France) pour que l'idée lui vienne de le propager



Utilisations (non documenté)

- Table (bon à croquer) Cuisine (bon à cuire) Jus Séchage Conserve
- Aucune indication

Données agronomiques

Type de variété : Fruit d'automne

Récolte Fin sept. à début oct. **Maturité** Déc. à janv.

Grosueur Gros fruits allongés

Chair Mi-fine, tendre, juteuse, à saveur délicate

Maladies Sensible à la tavelure

Remarques

Arbre vigoureux et fertile ; supporte l'altitude

Références

Arbre connu dans le Parc : chez M. Jean-Michel Huguenin à Lessoc sur la commune de Haut-Intyamont ; n°11 ; alt. 800 m

Baltet C., 1994 : Les bonnes poires

Vauthier B., 2008 : Le patrimoine fruitier de Suisse romande

Poire à Botzi

Description générale

Essence	Poirier
Variété	Botzi
Synonymes	Poire à Botzi Büschelbirne
Type de variété	Ancienne
Origine	Probablement origine italienne ; importée par des mercenaires nommée en 1744 à Fribourg



Utilisations (non documenté)

- Table (bon à croquer)
 Cuisine (bon à cuire)
 Jus
 Séchage
 Conserve

Autres indications : conserve, accompagnement d'agneau, dessert ; fait partie du menu traditionnel de la Bénichon ; son jus donne le meilleur vin cuit (raisinée)

Données agronomiques

Type de variété : Fruit précoce

Récolte Mi-août à mi-sept. **Maturité** Sept.

Grosueur Petite

Chair mi-grossière, juteuse, sucrée

Maladies Sensible à la tavelure

Remarques

Reconnu comme AOC depuis août 2007 ; altitude maximale autorisée pour l'AOC 900 m.
La Poire à Botzi doit son nom à la disposition de ses fruits en botsis soit bouquets.

Références

Arbre connu dans le Parc : chez M. Conrad Fracheboud à Montbovon sur la commune de Haut-Intyamon ; n°259 ; alt. 800 m

Pasquier G., 2007 : Annexes travail de diplôme

Vauthier B., 2008 : Le patrimoine fruitier de Suisse romande

Cahier des charges Poire à Botzi AOC

Corbaz R., 2006 : Les variétés fruitières de l'arboretum national du vallon de l'Aubonne

Poire Channe

Description générale

Essence	Poirier
Variété	Poire Channe
Synonymes	Kannenbirne Golia ou Colliard Cuisse-Madame Cannepire
Type de variété	Ancienne
Origine	Origine incertaine très ancienne. Présente en Suisse dès le 14e siècle



Utilisations (non documenté)

- Table (bon à croquer)
 Cuisine (bon à cuire)
 Jus
 Séchage
 Conserve
- Aucune indication

Données agronomiques

Type de variété : Précoce

Récolte	Début à mi-sept.	Maturité	De suite
Grosueur	Petite à moyenne, très allongée		
Chair	Blanche à crème, grossière, juteuse, sucrée, aromatique mais très astringente.		
Maladies	Pas d'indication		

Remarques

La poire blettit rapidement à l'intérieur sans signe extérieur. Séché ou cuit, le fruit perd toute son astringence.

Références

Arbre connu dans le Parc : chez M. Luc-Olivier Pasteur en Herniaule sur la commune de Villeneuve ; n°911 ; alt. 1210 m

Corbaz R., 2006 : Les variétés fruitières de l'Arboretum national du Vallon de l'Aubonne
 Vauthier B., 2011 : Le patrimoine fruitier de Suisse romande
 Leroy A., 1873 : Dictionnaire de Pomologie

Passe-Colmar

Description générale

Essence	Poirier
Variété	Passe-Colmar
Synonymes	Beurré d'Argenson Die Regentin
Type de variété	Classique
Origine	Obtenu par l'abbé d'Hardenpont en 1758 à Mons, Belgique.



Utilisations (non documenté)

- Table (bon à croquer) Cuisine (bon à cuire) Jus Séchage Conserve
- Aucune indication

Données agronomiques

Type de variété : Fruit de garde

Récolte Début oct. à début nov. Maturité Déc. à fin janv.

Grosueur Moyenne à grande

Chair Fondante à mi-cassante, blanc-jaunâtre, fine, juteuse, odorante, à peine granuleuse au centre.
Jus très abondant, très sucré, très vineux, possédant un parfum d'une rare délicatesse.

Maladies Très sensible à la tavelure

Remarques

Poire d'amateur à croquer. Préfère les endroits abrités du vent et doux.

Références

Arbre connu dans le Parc : chez M. Ami Desplands sur la commune de Château-d'Œx ; n°388 ; alt. 950 m

A. Leroy, 1873 : Dictionnaire de Pomologie
Aeppli A. et al., 1983 : 100 variétés de fruits
Kessler H., 1948 : Birnensorten der Schweiz

Passe-Crassane

Description générale

Essence	Poirier
Variété	Passe-Crassane
Synonymes	Edelcrassane Passa Crassana
Type de variété	Classique
Origine	Obtenu par le pépiniériste Boisbunel en 1845 à Rouen en France



Utilisations (non documenté)

- Table (bon à croquer)
 Cuisine (bon à cuire)
 Jus
 Séchage
 Conserve
- Aucune indication

Données agronomiques

Type de variété : Fruit de garde

Récolte Mi-oct. à début nov. **Maturité** jusqu'à fin janv.

Grosueur Moyenne à grande, de forme arrondie

Chair Blanche, fine, odorante, mi-fondante, un peu granuleuse au cœur. Jus abondant, sucré, parfumé, à saveur un peu âpre et un arrière-goût anisé agréable.

Maladies Sensible à la tavelure sur feuille et sur fruit

Remarques

Tendance à l'alternance. Demande des régions douces avec une longue période de végétation.

Références

Arbre connu dans le Parc : chez M. Philippe Morier-Genoud sur la commune de Rossinière ; n°121 ; alt. 920 m

A. Leroy, 1873 : Dictionnaire de Pomologie
Aeppli A. et al., 1983 : 100 variétés de fruits

Williams

Description générale

Essence	Poirier
Variété	Williams
Synonymes	Williams Christbirne Bon Chrétien Williams Barlet
Type de variété	Classique
Origine	Déjà connue en 1770 en Angleterre Dénommée d'après son propagateur



Utilisations

- Table (bon à croquer)
 Cuisine (bon à cuire)
 Jus
 Séchage
 Conserve
- Aucune indication

Données agronomiques

Type de variété : Fruit précoce

Récolte Fin août à début sept. **Maturité** De suite - jusqu'à deux semaines

Grosueur Moyenne à grosse

Chair Blanc jaunâtre, fondante, fine, juteuse, sucrée, typiquement parfumée, arôme prononcé

Maladies Modérément sensible à la tavelure
Très sensible aux attaques du psylle

Remarques

Tendance à former des fruits parthénocarpiques

Références

Arbre connu dans le Parc : chez M. Daniel Trinkler au Chamaveau sur la commune de Château-d'Œx ; n°68 ; alt. 900 m

Aeppli A., et al 1983 : 100 variétés de fruits