

Api rouge d'été

Description générale

Essence	Pommier
Variété	Api rouge d'été
Synonymes	Api d'été Cardinale d'été
Type de variété	Ancienne
Origine	France, Diel indique qu'il a reçu cette variété de Metz. Un catalogue relève la présence de cette variété en 1790.



Utilisations (non documenté)

- Table (bon à croquer)
 Cuisine (bon à cuire)
 Jus
 Séchage
 Conserve
 Aucune indication

Données agronomiques

Type de variété	: Précoce		
Récolte	Fin août à début sept.	Maturité	Fin août à mi-sept.
Grosueur	Fruits de taille moyenne		
Chair	Blanchâtre, assez ferme ; eau sucrée, douce, faiblement parfumée		
Maladies			

Remarques

Variété idéale en haute-tige, ne supporte pas d'être greffée au ras de terre. Bonne fertilité.

Références

Arbre connu dans le Parc : chez M. Ulrich Bieri dans la Vallée des Fénils sur la commune de Rougemont ; n°558 ; alt. 1465 m ; en espalier

Leroy, A., 1873 : Dictionnaire de Pomologie

Astracan blanc

Description générale

Essence	Pommier
Variété	Astracan blanc
Synonymes	Astracan d'été Blanche glacée ou gelée d'été
Type de variété	Ancienne
Origine	Astracan en Russie ; nom connu en 1831 ; variété issue d'un semis spontané



Utilisations (non documenté)

- Table (bon à croquer) Cuisine (bon à cuire) Jus Séchage Conserve
- Aucune indication

Données agronomiques

Type de variété : Fruit précoce

Récolte Fin juil. **Maturité** Fin juil. à début août

Grosueur Moyenne à grosse

Chair Très blanche, presque fondante, sucrée, acidulée, possédant un arôme particulier, savoureuse

Maladies

Remarques

Croissance assez lente
Variété très robuste

Références

Arbre connu dans le Parc : au Musée du Vieux Pays-d'Enhaut à Château d'œx sur la commune de Château-d'Oex ; n°132 ; alt. 950 m

Leroy A., 1873: Dictionnaire de pomologie

Berlepsch

Description générale

Essence	Pommier
Variété	Berlepsch
Synonymes	Baron de Berlepsch Berlepsch's Goldreinette
Type de variété	Ancienne
Origine	Croisement obtenu en Allemagne dans les années 1880



Utilisations (non documenté)

- Table (bon à croquer) Cuisine (bon à cuire) Jus Séchage Conserve
- Aucune indication

Données agronomiques

Type de variété : Fruit de garde

Récolte	Début oct.	Maturité	Déc. à mars
Grosueur	Moyenne		
Chair	Ferme, très juteuse, sucrée, acidulée et rafraîchissante, riche en vitamines C. Arôme typique et prononcé		
Maladies	Sensible au chancre Peu sensible à l'oïdium et à la tavelure		

Remarques

Préfère les endroits abrités ; sensible au gel d'hiver
Très sensible au soufre et sensible au cuivre

Références


Arbre connu dans le Parc : chez M. Georges Dubuis, au Village-Derrière à La Tine, sur la commune de Rossinière ; n°207 ; alt. 900 m

Bartha-Pichler B. et al, 2006 : Rosenapfel und Goldparmäne
Aeppli A., et al 1983 : 100 variétés de fruits

Boskoop rouge

Description générale

Essence	Pommier
Variété	Boskoop rouge
Synonymes	Schmitz-Hübsch Bieling
Type de variété	Classique
Origine	Mutant Boskoop, découverte à Wardmannshof (Allemagne) en 1923.



Utilisations

- (Table) (bon à croquer)
 Cuisine (bon à cuire)
 Jus
 Séchage
 Conserve
- Aucune indication

Données agronomiques

Type de variété : Fruit de garde

Récolte	Mi-sept. à début oct.	Maturité	Jusqu'à mi-janv.
Grosueur	Gros fruits		
Chair	Fruits plus ou moins rouge vif ; chair croquante, acidulée et parfumée		
Maladies	Arbre assez robuste Modérément sensible à la tavelure		

Remarques

Sensible au carpocapse (vers des pommes)
Tendance à l'alternance
Adapté à l'altitude et vigoureux

Références

Arbre connu dans le Parc : dans le village de Rossinière, sur la commune du même nom; n°367 ; alt. 900 m

Bartha-Pichler B. et al, 2006 : Rosenapfel und Goldparmäne
arboschwin.com

Calville blanc d'hiver

Description générale

Essence	Pommier
Variété	Calville blanc d'hiver
Synonymes	Quittenapfel Blanche de Zürich
Type de variété	Ancienne
Origine	Variété répandue avant 1600 sous diverses dénominations locales. Cultivée vers 1600 en Normandie aux environs d'Evreux, à Calleville.



Utilisations (non documenté)

- Table (bon à croquer)
 Cuisine (bon à cuire)
 Jus
 Séchage
 Conserve
- Aucune indication

Données agronomiques

Type de variété : Fruit de garde

Récolte Fin oct. **Maturité** Déc. à fév.

Grosueur Moyenne à grosse

Chair Chair jaunâtre, fine et ferme, juteuse, très sucrée ; parfum délicat ; fruits côtelés

Maladies Plus ou moins sensible à la tavelure

Remarques

Une des plus fines pommes de table, très riche en vitamine C
 Préfère les climats doux ou les situations abritées ; il supporte cependant l'altitude

Références

Arbre connu dans le Parc : chez M. Joël Mottier aux Chabloz sur la commune de Château-d'Œx ; n°64 ; alt. 950 m

Bartha-Pichler B. et al, 2006 : Rosenapfel und Goldparmäne
 Leroy A., 1873: Dictionnaire de Pomologie

Calville de Danzig

Description générale

Essence	Pommier
Variété	Calville de Danzig
Synonymes	Danziger Kantapfel, pomme fraise, pomme framboise
Type de variété	Ancienne
Origine	Inconnue. Figure déjà dans les écrits de pommologie en 1760



Utilisations (non documenté)

- Table (bon à croquer) Cuisine (bon à cuire) Jus Séchage Conserve
- Aucune indication

Données agronomiques

Type de variété : Fruit d'automne

Récolte	Mi-sept.	Maturité	Jusqu'à déc.
Grosueur	Moyenne à grosse		
Chair	blanchâtre avec nuance de vert, fine, fondante, juteuse, douce et acidulée ; arôme agréable		
Maladies	très sensible à la tavelure		

Remarques

Les fruits sont sensibles aux coups et ne se prêtent pas à la réfrigération.
Vigueur moyenne
Adapté à l'altitude

Références

Arbre connu dans le Parc : chez M. Alain Marmillod dans le village de Rossinière ; n°366 ; alt. 900 m

Bartha-Pichler B. et al., 2006 : Rosenapfel und Goldparmäne

Kessler H., 1947 : Apfelsorten der Schweiz

Corbaz R., 2006 : Les variétés fruitières de l'arboretum national du vallon de l'Aubonne

Court-Pendu Gris

Description générale

Essence	Pommier
Variété	Court-Pendu Gris
Synonymes	De Capendu Courpendu roux
Type de variété	Ancienne
Origine	Connue depuis 1400 au moins en France, Italie et Suisse. Origine très ancienne.



Utilisations (non documenté)

- Table (bon à croquer)
 Cuisine (bon à cuire)
 Jus
 Séchage
 Conserve
 Aucune indication

Données agronomiques

Type de variété : Fruit de garde

Récolte	Fin oct.	Maturité	Déc. à mars
Grosueur	Petite à moyenne		
Chair	Jaunâtre, ferme, odorante, très fine et très croquante. Jus très sucré, acidulé, doué d'un délicieux parfum de cannelle faiblement anisé.		
Maladies	Très sensible à la tavelure		

Remarques

Arbre vigoureux aussi bien en haute qu'en basse-tige. Doit son nom à son pédoncule très court.
« Il s'agit ici de l'antique *Capendu*, le plus ancien, le véritable type des divers pommiers de Court-Pendu. » (A. Leroy, 1873)

Références

Arbre connu dans le Parc : chez M. Régis Geinoz sur la commune de Haut-Intyamont ; n°226 ; alt. 780 m

Bartha-Pichler B. et al, 2006 : Rosenapfel und Goldparmäne
Leroy A., 1873: Dictionnaire de Pomologie
www.fruitiers.net
www.arboschwin.ch

Cox Orange

Description générale

Essence	Pommier
Variété	Cox Orange
Synonymes	Reinette Orange de Cox
Type de variété	Classique
Origine	Obtenu par R. Cox en Angleterre en 1825 ; répandue depuis 1850



Utilisations (non documenté)

- Table (bon à croquer) Cuisine (bon à cuire) Jus Séchage Conserve
- Aucune indication

Données agronomiques

Type de variété : Fruit de garde

Récolte Mi-sept. **Maturité** Jusqu'à déc.

Grosueur Moyenne à petite

Chair Arôme agréable, juteuse

Maladies Sensible à la tavelure et à l'oïdium

Remarques

Les fruits récoltés à l'Etivaz se conservent jusqu'en mars en cave naturelle.

Références

Arbre connu dans le Parc : chez M. Claude Mottier à L'Etivaz (Les Plans), sur la commune de Château-d'Œx ; n°61 ; alt. 1150 m

Bartha-Pichler B. et al, 2006 : Rosenapfel und Goldparmäne
Aeppli A., et al 1983 : 100 variétés de fruits

Gravenstein

Description générale

Essence	Pommier
Variété	Gravenstein
Synonymes	Gravensteiner
Type de variété	Classique
Origine	Semis de hasard provenant du Danemark ou du nord de l'Allemagne ; déjà connu en 1669



Utilisations (non documenté)

- Table (bon à croquer)
 Cuisine (bon à cuire)
 Jus
 Séchage
 Conserve
- Aucune indication

Données agronomiques

Type de variété : Fruit d'automne

Récolte Mi-août à fin août **Maturité** Oct.

Grosueur Moyenne à grosse

Chair Juteux ; mi-ferme ; arôme typique ; farineuse à surmaturité

Maladies

Remarques

Arbre à forte végétation
Sensible à la tavelure et à l'oïdium

Références

Arbre connu dans le Parc : chez M. Philippe Morier-Genoud sur la commune de Château-d'Œx ; n°52 ; alt. 900 m

Bartha-Pichler B. et al, 2006 : Rosenapfel und Goldparmäne
Aeppli A., et al 1983 : 100 variétés de fruits

Jubilé d'Argovie

Description générale

Essence	Pommier
Variété	Jubilé d'Argovie
Synonymes	Aargauer Jubiläum
Type de variété	Classique
Origine	Canton d'Argovie (19 ^{ème} s.)



Utilisations

- Table (bon à croquer)
 Cuisine (bon à cuire)
 Jus
 Séchage
 Conserve
- Aucune indication

Données agronomiques

Type de variété : Fruit de garde

Récolte	Mi-oct.	Maturité	Fin oct. à janv.
Grosueur	Grande		
Chair	Blanc verdâtre, tendre, juteuse, peu parfumée, acidulée, de faible qualité.		
Maladies	Sensible au chancre et à la tavelure		

Remarques

Variété à cuire, appréciée notamment pour la confection d'Apfelküchlein. Se porte mieux en haute-tige.

Références

Arbre connu dans le Parc : chez M. Daniel Pilloud aux Avants sur la commune de Montreux ; n°188 ; alt. 820 m

Kessler H., 1947 : Apfelsorten der Schweiz
 Bartha-Pichler B. et al., 2006 : Rosenapfel und Goldparmäne
 Corbaz R., 2006 : Les variétés fruitières de l'Arboretum National du Vallon de l'Aubonne
www.arboschwin.com

Pomme à Miel

Description générale

Essence	Pommier
Variété	Pomme à Miel
Synonymes	
Type de variété	Ancienne
Origine	Recensé par B. Vauthier (2011) à Font (Fribourg)



Utilisations (non documenté)

- Table (bon à croquer)
 Cuisine (bon à cuire)
 Jus
 Séchage
 Conserve
- Autres indications : appréciée pour la fabrication de vin cuit ou raisinée

Données agronomiques

Type de variété : Fruit d'automne

Récolte Début oct. **Maturité** Jusqu'à fin nov.

Grosueur Moyenne

Chair Assez juteuse, à texture assez fine, fibreuse. Saveur moyennement forte, moyennement sucrée, très peu acide et très peu astringente.

Maladies

Remarques

Peu sensible aux maladies.
La douceur de cette variété la rend idéale pour les jus parfois trop acides.

Références

Pas d'arbre connu en l'état dans le Parc. Greffons en provenance de Rétropomme ; n°971

Vauthier B., 2011 : Le patrimoine fruitier de Suisse romande
BDN : Base de Données Nationale suisse pour la conservation des ressources phyto-génétiques.
Bartha-Pichler B. et al., 2006 : Rosenapfel und Goldparmäne.

Pomme amère de Montbovon

Description générale

Essence	Pommier
Variété	Non documentée
Synonymes	
Type de variété	Ancienne
Origine	Variété située à la Comba-d'Amont (Montbovon) et utilisée pour la fabrication de cidre par Jacques Perittaz (Cf. plus bas)



Utilisations (non documenté)

- Table (bon à croquer)
 Cuisine (bon à cuire)
 Jus
 Séchage
 Conserve
 Aucune indication

Données agronomiques

Type de variété	Fruit d'automne		
Récolte	Oct.	Maturité	Jusqu'à nov. – déc.
Grosueur	Moyenne		
Chair	Pomme douce, sucrée, avec peu d'acidité, mais avec des principes amers et tanniques. Très parfumée		
Maladies	Sensible au chancre européen du pommier		

Remarques

Variété robuste, qui prospère très bien à Montbovon
 Excellente variété pour le cidre, découverte et utilisée par Jacques Perritaz de la cidrerie du Vulcain. A fait l'objet d'une citation dans la revue *Fructus* de décembre 2017
 Variété qui ne fait l'objet d'aucun inventaire

Références

Arbre connu dans le Parc : chez Jean-Marc Mantel à la Comba-d'Amont (Montbovon) sur la commune de Haut-Intyamon; n°973 ; alt. 850 m

Revue *Fructus* no 126, décembre 2017 : Les pommes douces méconnues
 Perritaz, J., 2018: Communication personnelle
 Girard D., 2018 : Observations personnelles

Pomme Cloche

Description générale

Essence	Pommier
Variété	Pomme Cloche
Synonymes	Glockenapfel Weisser Winterglockenapfel
Type de variété	Classique
Origine	Semis de hasard. Origine incertaine probablement D'Allemagne ou de Suisse. Déjà connue vers 1865



Utilisations (non documenté)

- Table (bon à croquer)
 Cuisine (bon à cuire)
 Jus
 Séchage
 Conserve
- Aucune indication

Données agronomiques

Type de variété	Fruit de garde		
Récolte	Mi oct.	Maturité	Déc. à début avril
Grosueur	Moyenne à grosse		
Chair	Blanc verdâtre, ferme, croquante, juteuse à acidité prononcée. Arôme typique au goût rafraîchissant		
Maladies	Sensible à la tavelure ; peu sensible à l'oïdium		

Remarques

Pomme ventrue à la base et comprimée vers l'œil, d'où son nom
En cave naturelle garde sa fraîcheur et son acidité jusqu'en mars
Aime les sols fertiles, pas trop froids avec des apports réguliers d'eau

Références

Arbre connu dans le Parc : chez M. Bertrand Sparsel à Villars-sous-Mont sur la commune de Bas-Intyamon ; n°378 ; alt. 760 m

Aeppli A., et al 1983 : 100 variétés de fruits
Bartha-Pichler B. et al, 2006 : Rosenapfel und Goldparmäne

Pomme de Fer

Description générale

Essence	Pommier
Variété	Pomme de Fer
Synonymes	Bohnapfel Grosser Rheinischer Bohnapfel
Type de variété	Ancienne
Origine	Vallée allemande du Rhin, où ce fruit est connu depuis la 2 ^{ème} moitié du 18 ^{ème} siècle



Utilisations (non documenté)

- Table (bon à croquer)
 Cuisine (bon à cuire)
 Jus
 Séchage
 Conserve
 Aucune indication

Données agronomiques

Type de variété : Fruit de garde

Récolte	Oct.	Maturité	Déc. à juin
Grosueur	Moyenne		
Chair	Blanc jaunâtre, grossière, juteuse et rafraîchissante. Acidité forte, s'affaiblissant en cours de conservation. Arôme peu marqué		
Maladies	Sensible à la tavelure		

Remarques

Variété robuste, adaptée à l'altitude et de très longue conservation ; par contre qualité du fruit moyenne
 Floraison mi-tardive
 Bonne variété pour le cidre

Références

Arbre connu dans le Parc devant la cure de Grandvillard; n°972 ; alt. 760 m

Bartha-Pichler B. et al, 2006 : Rosenapfel und Goldparmäne
 Kessler H., 1949 : Pomologie illustrée
 Corbaz R., 2006 : Les variétés fruitières de l'arboretum national du vallon de l'Aubonne

Pomme raisin

Description générale

Essence	Pommier
Variété	Pomme raisin
Synonymes	Sauergrauech Grauech
Type de variété	Classique
Origine	Semis de hasard, probablement originaire du canton de Berne. Déjà répandue au 19 ^e siècle



Utilisations (non documenté)

- Table (bon à croquer)
 Cuisine (bon à cuire)
 Jus
 Séchage
 Conserve
- Aucune indication

Données agronomiques

Type de variété : Garde

Récolte	Fin sept. à début oct.	Maturité	Nov. à mi-janv.
Grosueur	Fruits de petite taille		
Chair	Blanc verdâtre, croquante, très juteuse avec une acidité rafraichissante ; arôme prononcé, typique.		
Maladies	Sensible à la tavelure et à l'oïdium		

Remarques

Adapté à l'altitude. Variété moyennement vigoureuse.
 Variété sensible au soufre (donc attention aux produits de traitement)

Références

Arbres connus dans le Parc : chez M. Philippe Morier-Genoud sur la commune de Rossinière ; n°217 ; alt. 900 m
 également situé aux Bodemos sur la commune de Rougemont ; n°386 ; altitude 1000 m

Aeppli A., et al 1983 : 100 variétés de fruits

Rambour d'hiver

Description générale

Essence	Pommier
Variété	Rambour d'hiver
Synonymes	Rambour rouge/doux Rheinische Winterrambur
Type de variété	Ancienne
Origine	Connue depuis le 16 ^{ème} s. en France



Utilisations

- Table (bon à croquer)
 Cuisine (bon à cuire)
 Jus
 Séchage
 Conserve
- Aucune indication

Données agronomiques

Type de variété : Fruit de garde

Récolte	Oct.	Maturité	Nov. à mars
Grosueur	Grande		
Chair	Blanche, mi-fine, mi-tendre. Jus abondant, sucré, acidulé, rarement bien parfumé.		
Maladies	Peu sensible aux maladies.		

Remarques

Arbre vigoureux. Variété rustique.

Références

Arbre connu dans le Parc : chez Mme Cristina Beaud à Albeuve sur la commune de Haut-Intyamont ; n°172 ; alt. 750 m

Sources :
Leroy A., 1873. Dictionnaire de Pomologie.
Wikipedia

Reine des Reinettes

Description générale

Essence	Pommier
Variété	Reine des Reinettes
Synonymes	Goldparmäne
Type de variété	Classique
Origine	Semis de hasard ; déjà connue en France au Moyen-Age



Utilisations (non documenté)

- Table (bon à croquer) Cuisine (bon à cuire) Jus Séchage Conserve
- Aucune indication

Données agronomiques

Type de variété : Fruit d'automne

Récolte	Mi-sept.	Maturité	Jusqu'à déc.
Grosueur	Petite à moyenne		
Chair	Jaunâtre, un peu grossière, modérément juteuse, arôme prononcé, goût typique		
Maladies	Sensible au chancre et à la tavelure Faiblement sensible à l'oïdium		

Remarques

Demande des soins attentifs et une bonne situation ensoleillée

Références

Arbre connu dans le Parc : chez M. Georges Dubuis au Village-Derrière à La Tine sur la commune de Rossinière ; n°208 ; alt. 900 m

Bartha-Pichler B. et al, 2006 : Rosenapfel und Goldparmäne
Aeppli A., et al, 1983 : 100 variétés de fruits

Reinette Coulon

Description générale

Essence	Pommier
Variété	Reinette Coulon
Synonymes	
Type de variété	Ancienne
Origine	Trouvée à Liège par le pépiniériste Coulon en 1856, Belgique



Utilisations (non documenté)

- Table (bon à croquer) Cuisine (bon à cuire) Jus Séchage Conserve
- Aucune indication

Données agronomiques

Type de variété	Fruit de garde		
Récolte	Mi-oct.	Maturité	Nov. à mars
Grosueur	Gros fruits		
Chair	Mi-ferme, acidulée, parfumée et juteuse, sucrée. Similaire à Boskoop avec un arôme plus prononcé		
Maladies	Eventuellement Cf. Boskoop		

Remarques

Eventuellement Cf. Boskoop car variétés proches.

Références

Arbre connu dans le Parc : chez M. Vincent Grangier à La Combaz d'Avau sur la commune de Haut-Intyamont ; n°80 ; alt. 800 m

Bartha-Pichler B. et al, 2006 : Rosenapfel und Goldparmäne
Kessler H., 1947 : Apfelsorten der Schweiz

Reinette de Caux

Description générale

Essence	Pommier
Variété	Reinette de Caux
Synonymes	Dutch Mignonne Paternoster Holländische Goldreinette
Type de variété	Ancienne
Origine	Originaire de Hollande Elle se répand en Europe au cours du 18 ^{ème} siècle



Utilisations (non documenté)

- Table (bon à croquer)
 Cuisine (bon à cuire)
 Jus
 Séchage
 Conserve
 Aucune indication

Données agronomiques

Type de variété : Fruit de garde

Récolte	Oct.	Maturité	Déc. à avr.
Grosueur	Gros fruits, voire très gros fruits		
Chair	Jaunâtre, fine, ferme, assez croquante et très juteuse. Sucrée, savoureusement acidulée et agréablement parfumée		
Maladies	Moyennement sensible à la tavelure Assez résistante au chancre		

Remarques

Très bonne fertilité
 Adaptée à l'altitude, mais aime les sols bien fertiles et les situations ensoleillées
 Nécessité de bien suivre la taille afin d'éviter les fruits trop petits
 Bonne variété rustique, mais à ne pas planter dans des endroits frais

Références

Arbre connu dans le Parc : dans le préau de l'Etablissement scolaire du Pays-d'Enhaut sur la commune de Château-d'Œx ; n°228 ; alt. 1000 m

Leroy A., 1873: Dictionnaire de pomologie

Reinette de Maçon

Description générale

Essence	Pommier
Variété	Reinette de Maçon
Synonymes	Reinette Damason Damason Reinette
Type de variété	Ancienne
Origine	Vraisemblablement Mâcon en France ; nom connu en 1628



Utilisations (non documenté)

- Table (bon à croquer) Cuisine (bon à cuire) Jus Séchage Conserve
- Aucune indication

Données agronomiques

Type de variété	Fruit de garde		
Récolte	Mi-oct.	Maturité	Déc. à mars
Grosueur	Moyenne à petite		
Chair	Verdâtre, ferme, sucrée, assez fortement acidulée, bon goût		
Maladies	Risque d'éclatement de la peau		

Remarques

Une des plus anciennes variétés de pommes connues

Références

Arbre connu dans le Parc : chez M. Stéphane Moura sur la commune de Haut-Intyamont ; n°107 ; alt. 751 m

Bartha-Pichler B. et al, 2006 : Rosenapfel und Goldparmäne
Leroy A., 1873 : Dictionnaire de Pomologie

Reinette grise d'automne

Description générale

Essence	Pommier
Variété	Reinette grise d'automne
Synonymes	Graue Herbstreinette
Type de variété	Ancienne
Origine	Incertaine ; pomme connue déjà au 17 ^e siècle



Utilisations (non documenté)

- Table (bon à croquer) Cuisine (bon à cuire) Jus Séchage Conserve
- Aucune indication

Données agronomiques

Type de variété : Fruit d'automne

Récolte	Début oct.	Maturité	Jusqu'à déc.
Grosueur	Moyenne		
Chair	Juteuse, tendre et fine. Arôme doux légèrement sucré et acidulé		
Maladies	Sensible à la tavelure		

Remarques

Variété adaptée à l'altitude ; demande cependant des situations bien exposées
Les fruits se rident en fin de conservation, mais il s'agit d'une très bonne variété de table

Références

Arbre connu dans le Parc : Raymond Saugy sur la commune de Rougemont ; n°378 ; alt. 991 m
Bartha-Pichler B. et al, 2006 : Rosenapfel und Goldparmäne

Reinette grise française

Description générale

Essence	Pommier
Variété	Reinette grise française
Synonymes	Reinette de Cherbourg
Type de variété	Classique
Origine	France ; connue depuis le 12 ^{ème} siècle



Utilisations

- (Table) (bon à croquer)
 Cuisine (bon à cuire)
 Jus
 Séchage
 Conserve
- Aucune indication

Données agronomiques

Type de variété : Fruit de garde

Récolte	Mi-oct.	Maturité	Déc. à mars
Grosueur	Fruits moyens à gros		
Chair	Jaunâtre, fine, acidulée, parfumée et sucrée		
Maladies	Arbre robuste		

Remarques

Adapté à l'altitude
Tendance à l'alternance

Références

Arbre connu dans le Parc : chez M. Philippe Morier-Genoud sur la commune de Rossinière ; no 97 ; alt. 900 m
Appelée Boskoop jusqu'en 2009 ; déterminée sous Reinette grise française en 2009

Bartha-Pichler B. et al, 2006 : Rosenapfel und Goldparmäne

Reinette grise Parmentier

Description générale

Essence	Pommier
Variété	Reinette grise Parmentier
Synonymes	Reinette grise vaudoise
Type de variété	Classique
Origine	Pomme d'origine belge du premier tiers du 19 ^e siècle



Utilisations (non documenté)

- Table (bon à croquer) Cuisine (bon à cuire) Jus Séchage Conserve
- Aucune indication

Données agronomiques

Type de variété : Fruit de garde

Récolte Mi-oct. **Maturité** Déc. à mars

Grosueur Moyenne à grosse

Chair Acidulée juteuse avec un arôme marqué

Maladies

Remarques

Arbre vigoureux, peu sensible aux maladies

Références

Arbre connu dans le Parc : chez M. Marcel Morier aux Granges-d'Oex sur la commune de Château-d'Oex ; n°120 ; alt. 950 m

Bartha-Pichler B. et al, 2006 : Rosenapfel und Goldparmäne

Corbaz R., 2006 : Les variétés fruitières de l'arboretum national du vallon de l'Aubonne

Rose de Berne

Description générale

Essence	Pommier
Variété	Rose de Berne
Synonymes	Berner Rosen
Type de variété	Classique
Origine	Semis de hasard trouvé en 1888 près d'Oppligen (Canton de Berne)



Utilisations

- Table (bon à croquer) Cuisine (bon à cuire) Jus Séchage Conserve
- Aucune indication

Données agronomiques

Type de variété : Fruit d'automne

Récolte	Mi-sept.	Maturité	Jusqu'à déc.
Grosueur	Moyenne à grande		
Chair	Blanc verdâtre, assez fine, juteuse, goût rafraîchissant		
Maladies	Sensible à la tavelure Sensible à l'oïdium		

Remarques

Tendance à l'alternance
Adapté à l'altitude

Références

Arbre connu dans le Parc : chez M. Alain Marmillod sur la commune de Rossinière ; n°98 ; alt. 900 m

Bartha-Pichler B. et al, 2006 : Rosenapfel und Goldparmäne
Aeppli A. et al, 1983 : 100 variétés de fruits

Roter Eckapfel / Calville rose

Description générale

Essence	Pommier
Variété	Roter Eckapfel
Synonymes	Calleville rose Anguleuse longue Lothringer bunter Streifling
Type de variété	Ancienne
Origine	Hesse, Allemagne. Fin du 15 ^e s. au moins.



Utilisations (non documenté)

- Table (bon à croquer)
 Cuisine (bon à cuire)
 Jus
 Séchage
 Conserve
- Aucune indication

Données agronomiques

Type de variété	Fruit de garde		
Récolte	Mi-oct. à début nov.	Maturité	Oct. à fév.
Grosueur	Moyenne à grande		
Chair	Blanchâtre, fine, tendre, assez croquante. Jus abondant, sucré, délicieusement acidulé et parfumé.		
Maladies	Pas d'indication		

Remarques

Convient bien en haute-tige.

Références

Arbre connu dans le Parc : chez M. Armand Zulauff à l'Etivaz sur la commune de Château-d'Œx ; n°158 ; alt. 1200 m

Lucas E., 1867 : Pomologische Tafeln zum bestimmen der Obstsorten
Leroy A., 1873 : Dictionnaire de Pomologie
www.arboschwin.com

Transparente de Croncels

Description générale

Essence	Pommier
Variété	Transparente de Croncels
Synonymes	Eisapfel Glasapfel
Type de variété	Classique
Origine	Culture des frères Baltet à Croncel près de Troyes. Vendue depuis 1869



Utilisations (non documenté)

Table (bon à croquer) Cuisine (bon à cuire) Jus Séchage Conserve

Aucune indication

Bonne pomme à cuire

Données agronomiques

Type de variété : Fruit précoce

Récolte Fin août à mi-sept. **Maturité** Fin août à mi-oct.

Grosseur Moyenne à grosse

Chair Blanc verdâtre à saumonée, saveur agréablement musquée, juteuse, fine, acidulée, peu croquante et à gros grains ; fruits devenant rapidement farineux avec la maturité

Maladies

Remarques

Variété adaptée à l'altitude

Références

Arbre connu dans le Parc : chez M. Bernard Grangier à Montbovon sur la commune de Haut-Intyamon ; n°123 ; alt. 850 m

Bartha-Pichler B. et al, 2006 : Rosenapfel und Goldparmäne
Encyclopédie Wikipédia