

## Entretien des arbres fruitiers

	1 <sup>ère</sup> année	De 2 – 10 ans
<b>Arrosage</b>	Arroser régulièrement lors des périodes sèches, 1 fois par semaine de préférence en fin de journée. 3-4 arrosoirs par arbre.	En cas de nécessité (période sèche).
<b>Lutte contre les campagnols</b>	Lutte intensive, tout au long de l'année à proximité des arbres par piégeage. Renoncer aux appâts empoisonnés afin d'éviter d'empoisonner d'autres animaux sauvages qui se nourrissent de campagnols (1).	En cas de nécessité (pullulation de campagnols).
<b>Désherbage sur un rayon d'un mètre autour du tronc</b>	Maintenir le sol sans végétation afin d'éviter la concurrence de l'herbe et l'apparition de campagnols près des racines : - en sarclant régulièrement - ou en recouvrant le sol de copeaux, feuilles mortes ou autre matériel organique.	Maintenir le sol sans végétation pendant 3 ans ou au minimum coupe de l'herbe au pied des arbres, une fois par mois.
<b>Fertilisation</b>	Apport annuel de fumier bien décomposé, de compost, de terreau ou de râpures de corne, sur toute la largeur de la couronne.  Ne pas fertiliser les arbres depuis le mois de juillet afin d'éviter une croissance tardive des plantes, et donc d'éviter la formation de jeunes pousses tendres qui ne passeront pas l'hiver	Idem 1 <sup>ère</sup> année
<b>Attache</b>	Surveiller régulièrement l'attache ; adapter l'attache en cas de nécessité, voire la changer.	Idem 1 <sup>ère</sup> année
<b>Dégâts de bétail, gibier et machines</b>	Les protections contre le bétail et le gibier doivent faire l'objet d'une attention particulière. Le mieux est de protéger chaque arbre séparément, en l'entourant par exemple d'un treillis métallique.	Vérification régulière des protections.
<b>Débroussailleuse</b>	Ne pas faucher à la débroussailleuse à fil contre les arbres. Si l'écorce est blessée sur tout le tour de l'arbre, celui-ci meurt.	Idem 1 <sup>ère</sup> année

(1) Outre les mesures de lutte directes mentionnées dans le tableau, les prédateurs carnivores (renard, fouine, hermine,...) et les rapaces (buse, faucon, chouette,...) jouent un rôle non négligeable dans la régulation des populations de campagnols. Il faut donc maintenir un environnement qui leur soit favorable : haies, bosquets, arbres isolés, tas de pierres, perchoirs, etc.

La protection phytosanitaire des arbres fait l'objet d'une fiche séparée.